

Pertussis (Коклюш)

Что такое коклюш?

Pertussis (Коклюш) -это болезнь дыхательных путей и лёгких, которая очень легко распространяется. Другое название данного заболевания-коклюш.

Кто может заболеть коклюшем?

Несмотря на то, что в большинстве случаев заболевания коклюшем наблюдается у детей младше 5 лет, человек любого возраста может заболеть коклюшем.

Вакцинация от коклюша эффективна, но не является панацеей. Люди, имеющие вакцину против коклюша, могут заразиться, но болезнь, будет протекать в мягкой форме.

Многие дети младшего возраста, заболевшие коклюшем, могут заразиться от старших сестёр и братьев, родителей или людей, ухаживающими за детьми, которые не знают, что они инфицированы.

Как распространяется заболевание?

Бактерия, которая является причиной заболевания, может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путём при кашле или чихании.

Насколько серьёзно заболевание?

Коклюш может привести к серьёзному проявлению заболевания у людей всех возрастов, но, особенно опасен для детей до одного года и детей младшего возраста, которые не полностью вакцинированы.

- Приблизительно одному из трёх детей до года, которые заболели данным заболеванием, требуется госпитализация. Даже при госпитализации один ребёнок из ста умирает.

Когда проявляются симптомы заболевания?

Обычно симптомы заболевания начинаются через 5–10 дней после контакта с инфицированным человеком, но иногда симптомы заболевания не проявляются в течение 3 недель после контакта.

Каковы симптомы заболевания?

Ранними симптомами коклюша обычно являются:

- Насморк или заложенность носа
- Небольшой кашель, который случается время от времени (у маленьких детей данного симптома не наблюдалось)
- Невысокая температура (не более чем 100.4 °F =)
- Апноэ (опасные для жизни человека задержки в дыхании) или цианоз (синюшность кожных или слизистых покровов/слизистые покровы становятся голубого или лилового цвета) у детей старшего и младшего возраста.

После 1–2 недель может начаться интенсивный, приступообразный кашель. Данные симптомы обычно, продолжаются от 1 до 6 недель и могут стать причиной:

- Появление свистящего звука “whoop”, когда окончательно появляется возможность вдоха при приступе кашля.
- Рвота во время или после приступов кашля
- Ощущение усталости после приступа, но, обычно, возникающие между приступами
- Трудности с дыханием (невозможность дыхания)

У детей старшего возраста и взрослых, особенно у тех, кто был вакцинирован, могут проявляться симптомы в лёгкой форме.

Как предупредить возможность заражения коклюшем?

Наилучшим способом предупреждения заболевания коклюшем является вакцинация.

- Детям до одного года и детям младше 7 лет следует сделать вакцину DTaP по календарю прививок.
- Детям старшего возраста и взрослым следует сделать прививку Tdap.
- Беременным женщинам следует сделать прививку Tdap в 3 триместре беременности для защиты своих детей.

Профилактика заражения коклюшем:

- Прикрывайте нос и рот, когда чихаете или кашляете.
- Часто мойте руки с мылом или используйте антисептики на спиртовой основе.

For more information

Communicable Disease ~ 828.250.5109
40 Coxe Ave, Asheville, NC 28801

